

HIPRABOVIS 4

Vacuna mixta tetravalente contra los virus IBR, PI3, BVD y BRS, en suspensión inyectable

COMPOSICIÓN:

Virus IBR, PI3, BVD y BRS.

HIPRABOVIS 4, es una vacuna mixta tetravalente que induce la inmunidad activa frente a los virus de IBR, BVD, PI3 y BRS a fin de prevenir el Síndrome respiratorio bovino y el fallo reproductivo asociado a los virus IBR y BVD (infertilidad, aborto y vulvovaginitis pustular infecciosa).

INDICACIONES:

Bovinos adultos (Vacas y Novillas): Prevención de la Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), Vulvovaginitis pustular infecciosa (IPV) y Diarrea vírica bovina (incluida la enfermedad de las mucosas) (BVD).

Termeros: Prevención de la Rinotraqueítis infecciosa bovina (IBR), Parainfluenza 3 (PI3), Enfermedad de las mucosas o Diarrea vírica bovina (BVD) y Neumonía por virus respiratorio sincitial bovino (BRS).

POSOLÓGIA:

Bovinos (Termeros, Vacas y Novillas): 3 ml/bovino a partir de las 4 - 6 semanas de edad, independientemente de su peso y edad.

FORMA Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Inyección intramuscular, en los músculos del cuello o subcutánea, en la región de la papada.

PROGRAMA VACUNAL ORIENTATIVO:

Termeros: Vacunar con 1 dosis. Es aconsejable revacunar a los 21-30 días, sobre todo si se vacunan animales muy jóvenes. Dosis de recuerdo una vez al año.

Vacas: Vacunar con 1 dosis y revacunar a los 21-30 días. Dosis de recuerdo una vez al año.

Novillas: Vacunar con 1 dosis y revacunar a los 21-30 días, un mes antes de la primera cubrición. Dosis de recuerdo una vez al año.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:

- Vacunar únicamente animales sanos.
- Usar material estéril para su administración.
- Usar la vacuna en el plazo máximo de 3 horas después de ser reconstituida.
- Administrar la vacuna cuando esté a temperatura ambiente, entre +15 y +25 °C.
- Resuspender la fracción liofilizada con la fracción líquida y agitar antes de usar.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede aparecer una reacción anafiláctica en algún animal sensibilizado. En este caso, administrar epinefrina o un medicamento similar.

USO DURANTE GESTACIÓN Y LACTANCIA:

Puede utilizarse en cualquier momento durante la gestación o la lactancia.

TIEMPO DE ESPERA:

0 días.

ADVERTENCIAS ESPECIALES:

En caso de autoinyección accidental, consulte con un médico inmediatamente y muestrele el texto del envase o el prospecto.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN:

Guardar en un lugar oscuro entre +2 y +8 °C. No congelar.

PRECAUCIONES ESPECIALES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA ELIMINAR EL MEDICAMENTO NO UTILIZADO Y/O LOS ENVASES:

Tratar los materiales de desecho mediante ebullición, incineración o inmersión en un desinfectante adecuado que haya sido autorizado por las autoridades competentes.

PRESENTACIÓN:

- Caja 5 ds (líoilizado + vacuna líquida).
- Caja 30 ds (líoilizado + vacuna líquida).
- Caja 80 ds (líoilizado + vacuna líquida).

Medicamento sujeto a prescripción veterinaria

USO VETERINARIO

HIPRABOVIS 4

Tetravalent combined vaccine against the IBR, PI3, BVD and BRS viruses, in injectable suspension

COMPOSITION:

Viruses of IBR, PI3, BVD and BRS.

HIPRABOVIS 4, is a combined tetravalent vaccine that induces active immunity against the IBR, BVD, PI3 and BRS viruses to prevent bovine respiratory syndrome and the reproductive failure associated with the IBR and BVD viruses (infertility, abortion and infectious pustular vulvovaginitis).

INDICATIONS:

Adult cattle (Cows and Heifers): To prevent Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), Infectious pustular vulvovaginitis (IPV) and Bovine viral diarrhoea (including the Disease of the mucosas) (BVD).

Calves: To prevent Infectious bovine rhinotracheitis (IBR), Parainfluenza 3 (PI3), Disease of the mucosas or Bovine viral diarrhoea (BVD) and Pneumonia caused by bovine respiratory syncytial virus (BRS).

DOSAGE:

Cattle (Calves, Cows and Heifers): 3 ml/cattle from 4 - 6 weeks of age, for all weights and ages.

ADMINISTRATION ROUTE AND FORM:

Intramuscular, into the neck muscles, or subcutaneous, into the dewlap.

ORIENTATIONAL VACCINATION PROGRAMME:

Calves: Vaccinate with one dose. Revaccinate 21-30 days later, especially when very young calves are vaccinated. Administer a booster vaccination once a year.

Cows: Vaccinate with one dose. Revaccinate 21-30 days later. Administer a booster vaccination once a year.

Heifers: Vaccinate with one dose. Revaccinate 21-30 days later, one month before the first mating. Administer a booster vaccination once a year.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR USE:

- Vaccinate only healthy animals.
- Use sterile material when administering.
- Once the freeze-dried tablet has been resuspended, the vaccine must be administered within 3 hours.
- Administer the vaccine at a temperature between +15 and +25 °C.
- Resuspend the freeze-dried fraction with the liquid fraction and shake before use.

ADVERSE REACTIONS:

A sporadic anaphylactic reaction may appear in some sensitive animal. In such a case administer epinephrine or a similar drug.

USE DURING PREGNANCY AND LACTATION:

Can be administered at any time during pregnancy and lactation.

WITHDRAWAL PERIOD:

0 days.

SPECIAL PRECAUTIONS:

If you are accidentally injected with this product, seek prompt medical advice and take the package leaflet with you.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR STORAGE:

Store in a dark place between +2 and +8 °C. Do not freeze.

SPECIAL PRECAUTIONS FOR THE DISPOSAL OF UNUSED MEDICINAL PRODUCT OR WASTE MATERIALS, IF ANY:

Treat the disposable materials by boiling, incineration or immersion in a suitable disinfectant, which has been authorised by the competent authorities.

PRESENTATION:

- Box of 5 ds (freeze-dried tablet + liquid vaccine).
- Box of 30 ds (freeze-dried tablet + liquid vaccine).
- Box of 80 ds (freeze-dried tablet + liquid vaccine).

Under veterinary prescription

FOR VETERINARY USE ONLY



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com



LABORATORIOS HIPRA, S.A. Avda. la Selva, 135 . 17170 Amer (Girona) Spain

Tel. (34) 972 43 06 60. Fax (34) 972 43 06 61. hipra@hipra.com